CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SANIAR

Eficacia real para ambientes protegidos

Insecticidas y hormiguicidas de Uso Profesional Exclusivo, elaborados en San Agustín, Santa Fe, desde 2018.

www.saniar.com.ar
contacto.saniar@gmail.com

WhatsApp
+54 9 3426 33-6786

SUMARIO

Nuestros productos

Líquidos Concentrados

PLACK	Fipronil 20%
FIPROX DUO	Fipronil 2% + Piriproxifeno 2%
AIRE LIBRE	Lambdacialotrina 5%

Insecticidas Sólidos

POTENTE G	Fipronil 0,003%
POTENTE P	Fipronil 0,003%

Uso Profesional Exclusivo. Venta restringida a instituciones o empresas especializadas. Todos los productos cuentan con Registro Provincial de Establecimiento Domisanitario (R.P.E.D. N.º 21-000082) ante ASSAL. Antes de usar, lea siempre las instrucciones del rótulo.

SUSPENSIÓN CONCENTRADA · LÍQUIDOS CONCENTRADOS

PLACK

FIPRONIL 20%



1000 cc



200 cc



50 cc

Composición	Presentaciones	Formato	Uso
Fipronil 20%	**50 cc · 200 cc · 1000 cc**	**Líquido para diluir**	**Profesional exclusivo**

Descripción

Insecticida líquido concentrado a base de Fipronil 20%, formulado para diluir en agua. Actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso central de la plaga. Tiene poder residual, por lo que sigue actuando en el lugar de aplicación después de aplicado.

Espectro de control más relevante

Hormigas, grillos, alacranes, arañas, cucarachas, pulgas, garrapatas y piojos, tanto en el jardín como en el interior del hogar.

Modo de acción

Pertenece al grupo químico de los fenilpirazoles. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso central del insecto.

Recomendaciones

Diluir a razón de 1 cc por litro de agua. Aplicar con rociador en los sitios de tránsito de la plaga, o en balde para lavado de pisos. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, acuarios ni animales domésticos.

Uso profesional exclusivo. Venta restringida a instituciones o empresas especializadas. Antes de usar, lea las instrucciones del rótulo.

PLACK · EN DETALLE

Control de hormigas con poder residual

FIPRONIL 20%

¿Qué es PLACK?

PLACK es un insecticida hormiguicida líquido concentrado a base de Fipronil 20% (p/v), formulado para diluir en agua. Pertenece al grupo de los fenilpirazoles y se utiliza para el control de hormigas y otras plagas, tanto en el jardín como en el interior del hogar.



¿Para qué sirve?

PLAGA PRINCIPAL

Hormigas

TAMBIÉN CONTROLA

Grillos · Alacranes · Arañas · Cucarachas · Pulgas · Garrapatas · Piojos

Ambientes: interior del hogar, jardín y áreas exteriores.

¿Cómo actúa?

El fipronil actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso central del insecto: bloquea los canales de cloro regulados por GABA y provoca hiperexcitación y muerte.

> **Poder residual**
> El producto perdura en el lugar de aplicación y sigue actuando sobre los insectos que transitan después por las superficies tratadas.

¿Cómo se usa?

1 cc por litro de agua

Ejemplos de preparación: 5 cc en 5 litros · 10 cc en 10 litros.

1 Agitar

Agitar vigorosamente el envase antes de usar.

2 Diluir

Preparar la dilución a razón de 1 cc de PLACK por cada litro de agua.

3 Aplicar

Rociar las áreas de concentración o paso de hormigas, los hormigueros y los sitios por donde circulan las plagas. También puede prepararse en balde para usar con lampazo o trapo de piso.

Por qué elegirlo

- **Concentrado:** 1 cc rinde 1 litro de dilución; un envase de 1000 cc prepara hasta 1000 litros.
- **Efecto residual:** sigue actuando en el lugar de aplicación.
- **Versátil:** hormigas y otras plagas, en interiores y exteriores, con rociador o en balde.
- **Presentaciones:** 50 cc, 200 cc y 1000 cc.

Tené en cuenta

- No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina ni acuarios.
- Durante la aplicación no deben permanecer personas ni animales domésticos.
- Usar ropa protectora, guantes y protección ocular y/o respiratoria. No fumar ni comer durante la aplicación.
- Tóxico para abejas, aves y peces: no aplicar cerca de colmenas ni de cursos de agua.

¿Consultas, pedidos o asesoramiento técnico? WhatsApp +54 9 3426 33-6786

SUSPENSIÓN CONCENTRADA · LÍQUIDOS CONCENTRADOS

FIPROX DUO

FIPRONIL 2% + PPX 2%



1000 cc



200 cc



50 cc

Composición	Presentaciones	Formato	Uso
Fipronil 2% + Piriproxifeno 2%	**50 cc · 200 cc · 1000 cc**	**Líquido para diluir**	**Profesional exclusivo**

Descripción

Insecticida de acción combinada: Fipronil, con acción sobre insectos adultos, y Piriproxifeno, un regulador de crecimiento de última generación que impide que las nuevas generaciones lleguen a la madurez sexual, evitando la reproducción y el crecimiento poblacional de la plaga.

Espectro de control más relevante

Cucarachas, hormigas, arañas, ácaros, chinches, pulgas, garrapatas, bicho bolita, mosquitos, moscas, tábanos y polillas.

Modo de acción

El fipronil actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso del insecto adulto. El piriproxifeno actúa como regulador de crecimiento, interrumpiendo el desarrollo de los estadios inmaduros de la plaga.

Recomendaciones

Agitar bien antes de usar. Diluir de 10 a 15 cc por litro de agua para cubrir 20 m² aproximadamente, aumentando la dosis en superficies porosas o infestaciones altas. Aplicar sobre paredes, techos, pisos y zonas de concentración de la plaga. Repetir la aplicación ante indicios de reaparición.

Uso profesional exclusivo. Venta restringida a instituciones o empresas especializadas. Antes de usar, lea las instrucciones del rótulo.

FIPROX DUO · EN DETALLE

Doble acción: adultos y reproducción

FIPRONIL 2% + PPX 2%

¿Qué es FIPROX DUO?

FIPROX DUO SC es un insecticida cucarachicida de acción combinada, en suspensión concentrada de base acuosa: Fipronil 2% y Piriproxifeno 2%. Combina un adulticida con un regulador de crecimiento de insectos para actuar sobre los individuos presentes y sobre el ciclo de reproducción de la plaga, en el jardín y en el interior de hogares o establecimientos.



¿Para qué sirve?

INSECTOS RASTREROS

Cucarachas · Hormigas · Arañas · Ácaros · Chinches · Pulgas · Garrapatas · Bicho bolita

INSECTOS VOLADORES

Mosquitos · Moscas · Tábanos · Polillas

¿Cómo actúa?

Dos principios activos que trabajan en frentes distintos:

Fipronil · adulticida
Actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso del insecto adulto: hiperexcitación, parálisis y muerte.

Piriproxifeno · regulador de crecimiento (IGR)
Análogo de la hormona juvenil: interrumpe el desarrollo de los estadios inmaduros, impide la madurez sexual y evita la reproducción y el crecimiento poblacional.

La combinación aporta estabilidad y acción residual.

¿Cómo se usa?

10 a 15 cc por litro de agua

Cada litro de dilución cubre aproximadamente 20 m². Usar la dosis mayor en superficies porosas o absorbentes y en infestaciones altas.

1 Agitar
Agitar vigorosamente el envase antes de usar.

2 Diluir
Preparar 10 a 15 cc de FIPROX DUO SC por litro de agua.

3 Aplicar
Rociar paredes, techos, pisos y áreas de concentración de la plaga, o usar en balde con lampazo o trapo.

4 Repetir
Repetir ante cualquier indicio de presencia de insectos.

Por qué elegirlo

- **Control integrado:** reduce los adultos expuestos e interrumpe el ciclo biológico, disminuyendo el recambio poblacional.
- **Amplio espectro:** insectos rastreros y voladores.
- **Acción residual** y base acuosa: se diluye en agua.
- **Presentaciones:** 50 cc, 200 cc y 1000 cc.

Tené en cuenta

- No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina ni acuarios.
- Puede producir irritación ocular ante contacto directo: evitar salpicaduras y usar protección ocular.
- Usar guantes y ropa de trabajo que cubra el cuerpo. No ingerir ni inhalar; no fumar ni comer durante la aplicación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

¿Consultas, pedidos o asesoramiento técnico? **WhatsApp +54 9 3426 33-6786**

CONCENTRADO EMULSIONABLE · LÍQUIDOS CONCENTRADOS

AIRE LIBRE

LAMBDACIALOTRINA 5%



1000 cc



250 cc



50 cc

Composición	Presentaciones	Formato	Uso
Lambdacialotrina 5%	**50 cc · 250 cc · 1000 cc**	**Concentrado emulsionable**	**Profesional exclusivo**

Descripción

Insecticida a base de Lambdacialotrina, formulado para diluir en agua y usar al aire libre. Se caracteriza por su alto poder de volteo en tratamientos de espacios exteriores.

Espectro de control más relevante

Moscas, chinches, mosquitos, tábanos y avispas. Apto también para cucarachas, jejenes y otros insectos.

Modo de acción

Insecticida de amplio espectro que actúa sobre el sistema nervioso del insecto, provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y muerte. Actúa por contacto, fundamentalmente sobre insectos masticadores y chupadores.

Recomendaciones

Diluir de 2 a 3 cc por litro de agua. Aplicar al aire libre con pulverizador manual o motorizado sobre césped, paredes o columnas.

Uso profesional exclusivo. Venta restringida a instituciones o empresas especializadas. Antes de usar, lea las instrucciones del rótulo.

AIRE LIBRE · EN DETALLE

Alto poder de volteo para exteriores

LAMBDACIALOTRINA 5%

¿Qué es AIRE LIBRE?

AIRE LIBRE es un insecticida líquido concentrado emulsionable a base de Lambdacialotrina 5%, formulado para diluir en agua y usar al aire libre. Se aplica sobre césped, suelo, paredes o columnas con cualquier tipo de pulverizador, manual o motorizado.



¿Para qué sirve?

CONTROLA

- Moscas
- Chinches
- Mosquitos
- Tábanos
- Avispas

APTO TAMBIÉN PARA

- Cucarachas
- Jejenes
- Orugas (lepidópteros)
- Otros insectos

¿Cómo actúa?

Insecticida de amplio espectro. Actúa por contacto sobre el sistema nervioso del insecto: hiperexcitación, convulsiones, parálisis y muerte, fundamentalmente en insectos masticadores y chupadores.

Eficacia en ensayos de laboratorio
Con lepidópteros, mosquitos (Aedes y Anopheles) y cucaracha alemana: efecto a los pocos minutos, letal entre 30 min y 1 h, y 100% de eficacia a las 12 h de contacto.

¿Cómo se usa?

2 a 3 cc por litro de agua

Aplicar en una superficie no menor a 6 a 8 metros de radio, en lugares abiertos.

1 Agitar

Agitar vigorosamente el envase antes de usar.

2 Diluir

Preparar de 2 a 3 cc de AIRE LIBRE por litro de agua.

3 Aplicar

Pulverizar sobre el pasto o suelo y sobre las paredes o columnas del área, que son el lugar de preferencia de la plaga.

Por qué elegirlo

- **Alto poder de volteo** sobre insectos voladores.
- **Pensado para exteriores:** formulado para usar al aire libre y estable a la luz.
- **Cualquier pulverizador,** manual o motorizado.
- **Presentaciones:** 50 cc, 250 cc y 1000 cc.

Tené en cuenta

- Inflamable: mantener lejos de llamas y de superficies calientes.
- No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas ni acuarios.
- Extremadamente tóxico para organismos acuáticos y altamente tóxico para abejas: no aplicar cerca de cursos de agua ni de colmenas.
- Sin personas ni animales domésticos durante la aplicación. Usar ropa protectora, guantes y protección ocular y/o respiratoria.

¿Consultas, pedidos o asesoramiento técnico? **WhatsApp +54 9 3426 33-6786**

CEBO GRANULADO · INSECTICIDAS SÓLIDOS

POTENTE G

FIPRONIL 0,003%



200 g



500 g



500 g (talquera)

Composición	Presentaciones	Formato	Uso
Fipronil 0,003%	**200 g · 500 g (talquera) · 1 kg · 5 kg**	**Cebo granulado, listo para usar**	**Profesional exclusivo**

Descripción

Cebo granulado listo para usar, sin necesidad de dilución ni preparación previa. Formulado sin olor detectable, para evitar el rechazo del cebo por parte de la hormiga.

Espectro de control más relevante

Hormigas: hormiga negra jardinera / hormiga argentina, hormiga colorada y hormiga cortadora.

Modo de acción

Cebo de acción lenta, por ingestión, con efecto de transferencia entre individuos de la colonia. Se requieren aproximadamente 4 a 7 días para lograr el control total del hormiguero.

Recomendaciones

Aplicar 10 g por camino de circulación en actividad, o por boca de ingreso al hormiguero. No aplicar con pronóstico de lluvia, suelo húmedo o presencia de rocío. Usar guantes durante la aplicación.

Uso profesional exclusivo. Venta restringida a instituciones o empresas especializadas. Antes de usar, lea las instrucciones del rótulo.

POTENTE G · EN DETALLE

Un cebo que llega hasta la reina

FIPRONIL 0,003%

¿Qué es POTENTE G?

POTENTE G es un cebo granulado hormiguicida listo para usar: no requiere dilución ni preparación previa. Contiene Fipronil 0,003% sobre un soporte de granos de arroz partido con azúcar como atrayente, y está formulado sin olor detectable para evitar que las hormigas rechacen el cebo.



¿Para qué sirve?

Hormigas, incluyendo:

Hormiga negra jardinera / argentina *(Linepithema humile)*

Hormiga colorada / de fuego *(Solenopsis spp.)*

Hormiga cortadora *(Atta spp., Acromyrmex spp.)*

¿Cómo actúa?

Cebo de acción lenta, por ingestión: no repelente y sin volteo inmediato, para que el fipronil se distribuya dentro de la colonia.

1 · Ingieren
Las obreras forrajeras toman el cebo en los caminos tratados.

2 · Transportan
Lo llevan al interior del hormiguero.

3 · Comparten
El fipronil se transfiere entre individuos (trofalaxia) y alcanza a la reina y a la cría.

Se requieren aproximadamente 4 a 7 días para lograr el control total del hormiguero.

¿Cómo se usa?

10 g por camino o boca de ingreso

Por cada camino de circulación en actividad o por cada boca de ingreso al hormiguero. Listo para usar, sin dilución.

1 Ubicar

Identificar los caminos de circulación en actividad y las bocas de ingreso al hormiguero.

2 Dosificar

Colocar 10 g con aplicador o dosificador, en la boca de ingreso o en el punto exacto del camino, sin dejar producto suelto en superficies accesibles.

3 Verificar

Al terminar, comprobar que no quede producto expuesto.

Por qué elegirlo

- **Listo para usar:** sin dilución ni preparación.
- **Sin olor detectable:** evita el rechazo del cebo.
- **Efecto de transferencia:** controla la colonia, no solo a las obreras visibles.
- **También en talquera,** con tapa perforada para el paso del grano.

Tené en cuenta

- No tocar el producto con las manos: usar guantes de nitrilo o descartables.
- No aplicar con pronóstico de lluvia, suelo húmedo o presencia de rocío.
- Aplicar solo en áreas de difícil acceso para niños y animales domésticos, y sin personas ni animales ajenos a la tarea.
- La ingestión accidental es la principal vía de riesgo: mantener fuera del alcance de niños y animales.

¿Consultas, pedidos o asesoramiento técnico? WhatsApp +54 9 3426 33-6786

POLVO SECO · INSECTICIDAS SÓLIDOS

POTENTE P

FIPRONIL 0,003%



250 g



1 kg



250 g (talquera)

Composición	Presentaciones	Formato	Uso
Fipronil 0,003%	**250 g · 250 g (talquera) · 1 kg · 5 kg**	**Polvo seco, listo para usar**	**Profesional exclusivo**

Descripción

Hormiguicida en polvo, listo para usar sin dilución previa.

Espectro de control más relevante

Hormigas: hormiga negra jardinera / hormiga argentina, hormiga colorada y hormiga cortadora.

Modo de acción

De acción progresiva, actuando por ingestión y contacto sobre la colonia tratada en los días posteriores a la aplicación.

Recomendaciones

Aplicar 10 g por camino de hormigas en actividad, distribuyendo el polvo sobre los caminos o bocas de ingreso. No aplicar con pronóstico de lluvia, suelo húmedo o presencia de rocío. Para la presentación en talquera, agitar suavemente sin invertir el envase cerca del rostro y usar protección respiratoria.

Uso profesional exclusivo. Venta restringida a instituciones o empresas especializadas. Antes de usar, lea las instrucciones del rótulo.

POTENTE P · EN DETALLE

Polvo listo para usar sobre los caminos

FIPRONIL 0,003%

¿Qué es POTENTE P?

POTENTE P es un hormiguicida en polvo seco listo para usar, sin dilución. Contiene Fipronil 0,003% sobre un soporte inerte de carbonato de calcio y se aplica directamente sobre los caminos y las bocas de ingreso de los hormigueros.



¿Para qué sirve?

Hormigas, incluyendo:

Hormiga negra jardinera / argentina *(Linepithema humile)*

Hormiga colorada / de fuego *(Solenopsis spp.)*

Hormiga cortadora *(Atta spp., Acromyrmex spp.)*

¿Cómo actúa?

Acción progresiva, por ingestión y contacto: no repelente y sin volteo inmediato, para que el fipronil llegue al interior de la colonia.

1 · Recogen
Las obreras recogen el polvo al transitar por los caminos tratados.

2 · Transportan
Lo llevan hasta el hormiguero.

3 · Comparten
Se transfiere entre individuos por contacto y trofalaxia, y alcanza a la reina y a la cría.

Actúa sobre la colonia tratada en los días posteriores a la aplicación.

¿Cómo se usa?

10 g por camino de hormigas en actividad

Distribuir el polvo dentro de los caminos, sobre ellos o en las bocas de ingreso de los hormigueros. Listo para usar, sin dilución.

1 Ubicar

Aplicar cuando se observe plena actividad de la plaga.

2 Distribuir

Aplicar 10 g por camino de hormigas, dentro o sobre el camino, o en las bocas de ingreso de los hormigueros.

3 Talquera

Agitar suavemente sobre el camino, sin formar nubes de polvo y sin invertirla cerca del rostro.

Por qué elegirlo

- **Listo para usar:** sin dilución ni preparación.
- **Aplicación directa** sobre caminos y bocas de hormigueros.
- **Efecto de transferencia** hacia la reina y la cría.
- **Dos formatos:** bolsa de 250 g, 1 kg y 5 kg, y talquera espolvoreadora de 250 g.

Tené en cuenta

- No tocar el producto con las manos: usar guantes de nitrilo o descartables.
- No aplicar con pronóstico de lluvia, suelo húmedo o presencia de rocío.
- Con la talquera, usar protección respiratoria (barbijo o máscara con filtro para partículas).
- Aplicación en exteriores, sobre caminos y bocas de hormigueros; no en superficies de uso doméstico. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

¿Consultas, pedidos o asesoramiento técnico? WhatsApp +54 9 3426 33-6786

¿Consultás por un producto o por precios?

Escribinos por WhatsApp para consultas, pedidos o asesoramiento técnico. Venta directa de fábrica y atención mayorista.

WhatsApp	**+54 9 3426 33-6786**
Email	**contacto.saniar@gmail.com**
Web	**www.saniar.com.ar**
Sede	**San Agustín, Santa Fe**

SANIAR — Sociedad de la Sección IV de la Ley 19.550 de Francisco Javier Morales y Vicente Morales
CUIT 30-71615346-7 · R.P.E.D. N.º 21-000082 (ASSAL) · San Agustín, Las Colonias, Santa Fe · © 2026